



EL


JULIO 2023

ESTUDIO DE HERMANAS

INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE SENO

¡Nuestros hallazgos más recientes!

En una reciente [publicación del Estudio de Hermanas](#) examinamos si la cirugía ginecológica estaba relacionada con el riesgo de las mujeres de desarrollar cáncer de seno. Dado que muchas mujeres que se someten a una histerectomía (extirpación del útero) o una ovariectomía bilateral (extirpación de ambos ovarios) a menudo reciben terapia hormonal, también consideramos los efectos combinados de la cirugía y la terapia hormonal. Encontramos que haber tenido una ovariectomía bilateral se asoció con una menor incidencia de cáncer de seno, tanto en general como cuando se acompañó de una terapia hormonal con estrógenos sin oposición. Por el contrario, la histerectomía sin ovariectomía bilateral se asoció con una mayor incidencia de cáncer de seno, particularmente en mujeres que también recibieron terapia hormonal con estrógenos más progestina. Este trabajo fue dirigido por la pasante de verano, Sharonda Lovett, quien actualmente está finalizando su doctorado (PhD) en Epidemiología.



¿Ha completado su encuesta de Actualización Anual?

¡Gracias si ya completó su encuesta de Actualización Anual de Salud 2022-2023! En octubre de 2022, comenzamos a comunicarnos con todas las Hermanas para que respondan su Actualización Anual de Salud. ¡El 81.6% de nuestras participantes ya han respondido! Si desea completar el cuestionario en línea, haga clic en el siguiente enlace:

<https://sisterstudy.niehs.nih.gov/Spanish/index1.htm>

¡Estamos profundamente agradecidos por su participación continua! Si no ha recibido su encuesta de Actualización Anual de Salud o tiene alguna pregunta o inconveniente, comuníquese con nuestro servicio de asistencia al número gratuito 877-4SISTER (877-474-7837) o envíenos un correo electrónico a

update@sisterstudy.org.

¡Con gusto le ayudaremos!

Complicaciones del embarazo y cáncer de seno premenopáusico

Las complicaciones del embarazo, la preeclampsia y el parto prematuro pueden influir en el riesgo futuro de cáncer de seno de diferentes maneras, aunque las mujeres con preeclampsia tienen más probabilidades de tener un parto prematuro. Se necesitó un estudio muy grande para desentrañar estas relaciones. En un [artículo publicado recientemente](#), los investigadores del Estudio de Hermanas dirigieron un análisis de datos de 6 estudios de cohortes diferentes, incluido el Estudio de Hermanas, para tratar de comprender cómo la preeclampsia y el parto prematuro pueden estar relacionados con el cáncer de seno que aparece antes de la menopausia. Hallaron que las mujeres que tuvieron preeclampsia tenían menos probabilidades de desarrollar cáncer de seno premenopáusico. Si bien el parto prematuro no se asoció con el cáncer de seno premenopáusico entre todas las mujeres, se asoció con tasas más elevadas de cáncer de seno premenopáusico entre aquellas que tuvieron preeclampsia o hipertensión gestacional (presión arterial alta durante el embarazo). Este estudio contribuye a aclarar las complejas relaciones entre determinadas complicaciones del embarazo y el riesgo de cáncer de seno premenopáusico, y puede ayudar a identificar a las mujeres de alto riesgo.

<https://tinyurl.com/CancerHypPreg>